


Traité de l'aspiration des liquides morbides, méthode médico-chirurgicale de diagnostic: et de traitement : kystes et abcès du foie, hernie étranglée, rétention d'urine... PDF - Télécharger, Lire



TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description

Traité de l'aspiration des liquides morbides, méthode médico-chirurgicale de diagnostic et de traitement : kystes et abcès du foie, hernie étranglée, rétention d'urine, péricardite, pleurésie, hydarthrose, etc., par le Dr Georges Dieulafoy,...

Date de l'édition originale : 1873

Ce livre est la reproduction fidèle d'une œuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.

Les œuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes sur Gallica, sa bibliothèque numérique.

En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et

participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles. Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

Le syndrome hémolytique et urémique à STEC – traitement et perspectives . Prises en charge chirurgicales des lithiases urinaires de l'enfant ... est complémentaire de l'apprentissage théorique et il prolonge la rétention de .. Les patients présentant au diagnostic une ostéomyélite ou un abcès .. guided aspirations.

13 juin 2017 . Méthodes de dépistage et critères diagnostiques On réalise, une fois le diagnostic hormonal fait, une imagerie .. kystes rénaux, carcinome rénal à cellules . Traitement Le traitement est chirurgical (avec examen histologique .. et une hypertension artérielle traitée par lisinopril 20 mg (Zestril®).

22 mai 2014 . Apport de la thoracoscopie dans le traitement de .. Du fait de l'élimination urinaire de l'antigène poly-saccharidique .. cas rares de formes à révélation tardive, une fois le diagnostic .. aUnité médicochirurgicale grands enfants, pédiatrie 1, hôpital ... hernie inguinale ou d'une tumeur est possible.

20 févr. 2012 . considérable, véritable premier et fondamental traité de minéralogie et gemmologie ... Traité de l'aspiration des liquides morbides. Méthode médico-chirurgicale de diagnostic et de traitement. Kystes et abcès du foie - Hernie étranglée -. Rétention d'urine - Péricardite - Pleurésie - Hydarthrose, etc Paris, G.

Cf04 Imagerie des kystes hydatiques urinaires Hendaoui Lotfi. .. autant de fois qu'il faut jusqu'à fragmentation du calcul et passage du liquide en amont. 2. .. rénale aigue en urologie constituant ainsi une véritable urgence médicochirurgicale. .. endoscopique est une méthode efficace et peu morbide dans le traitement.

ICD-10-CM comprend les codes des diagnostics tandis qu'ICD-10-PCS .. principal sauf si le traitement concerne uniquement la rétention urinaire. ... ni le naevus, ni la hernie ne sont traités ni ne font l'objet d'une évaluation .. Qualificateur : le 7° caractère d'un code de la section médico-chirurgicale ; il apporte une.

. abbevillienne abc abcéder abcès abdicataire abdication abdiquer abdomen ... aspirante aspirateur aspiration aspiratoire aspiratrice aspirée aspirée aspirer ... chiropractrice chiropraticienne chiropraxie chiroptère chirurgicale chirurgie ... diadoque diagnose diagnostic diagnosticienne diagnostiquée diagnostiquer.

aspiration des sécrétions nasales pour le diagnostic rapide .. Le traitement est différent en

pédiatrie ambulatoire . 80 mL/kg de liquide avec un supplément de 20 à 25 mL/kg en . Toutefois, on peut s'interroger sur la méthodologie et la ... épileptique et on le traite comme tel. 2. .. Mallory-Weiss, hernies, prolapsus rectal.

Stratégies thérapeutiques les 2 premières années après un diagnostic de cancer .

Recommandations pratiques pour le diagnostic et la prise en charge de la.

porté sur le traitement et le point de vue chirurgical . et alors l'abcès s'ouvre dans un des viscères de l'abdo- . manuels et les traités de pathologie. Dans la .. Ainsi il arrive de voir une rétention d'urine (obs. 12, . Le diagnostic de la pérityphlite et de l'appendicite . hernie étranglée, les affections de l'utérus et de ses.

la hernie diaphragmatique, et plus récemment la chirurgie de l'obésité et la chirurgie .. traitement préventif ; en pratique, le diagnostic de cancer colorectal aura été fait ... des conséquences fonctionnelles génito-urinaires parfois handicapantes. .. kyste hydatique du foie qui a été traité d'une façon conservatrice et une.

Méthodes : Nous avons recherché des articles publiés en langue anglaise entre 2010 et ..

DRAINAGE LAPAROSCOPIQUE DES ABCÈS DU FOIE A YAOUNDE .. Contexte : La hernie inguinale est considérée comme étant courante dans .. Elle a été traitée pour une infection urinaire, puis a subi une cystolithotomie à.

C réactive protéine et diagnostic d'infection néonatale. ... Calculs urinaires et cristalluries chez les patients VIH+ traités par le sulfate d'indinavir. ... Cancer de prostate de forme kystique: une entité clinique de carcinome ductal. .. le traitement de la hernie inguinale unilatérale: peut-on minimiser le surcoût opératoire?

Méthode médico-chirurgicale de diagnostic et de traitement. Kystes et abcès du foie - Hernie étranglée - Rétention d'urine - Péricardite - Pleurésie - Hydarthrose.

donc pas de traitement statistique de données dans cette thèse. ... La géographie de la santé est à la fois une discipline très récente et très . outils et les méthodes d'une approche quantitative en géographie de la .. chirurgical ou autre – est largement tributaire de l'état du système de soins .. Rétention urinaire aiguë.

(1)Traité de l'impuissance et de la stérilité chez l'homme et chez la femme, p. .. Traité de pathologie et chirurgie de l'appareil urinaire, par le docteur MALLE.

Elles feront appel aux différentes méthodes d'apprentissage à . Chirurgie Vasculaire s'est inscrit dans l'esprit de la réforme du deuxième cycle des études .. d'autres facteurs de risque existent, le seuil de mise en route d'un traitement .. lymphoedème (diagnostic clinique), la rupture d'un kyste poplité ou d'un hématome.

9 oct. 2015 . III- Syndrome distensif: trouble statique lié à une rétention d'air ⇒ CPT .. est un tissu mésenchymateux fait de 1- plasma (liquide dans lequel baignent les ... sur culot urinaire (par desquamation des cellules tubulaires proximales) ... **DIAGNOSTIC POSITIF**

ÉTIOLOGIES TRAITEMENT PaCO2 HCO3- 10 30.

. Abcède Abcéder Abcès Abdicataire Abdication Abdiquant Abdique Abdiquer ... Aspirant Aspirante Aspirateur Aspiration Aspiratoire Aspiratrice Aspire Aspiré .. Chiroptère Chirurgical Chirurgicale Chirurgicalement Chirurgicaux Chirurgie .. Diadoque Diagenèse Diagnose Diagnostic Diagnostiquant Diagnostique.

Une fois sur deux il est iliaque droit, une fois sur 3 à hauteur de 13 cm ... Ainsi l'abondance des liquides en rétention est augmentée et la distension accrue.

heures pour les liquides clairs et non gazeux, et de 6 . Hernie inguinale. 7. 84. 44. 15 .. de rétention urinaire et de l'apparition d'un prurit, ou .. le traitement de ces complications, en sachant que . La sortie doit être autorisée à la fois par l'anesthésiste ayant pratiqué l'anesthésie .. patient à l'équipe médicochirurgicale.

. l'aspiration des liquides morbides: méthode médico-chirurgicale de diagnostic et de ." ..

organes^ kystes et abcès du foie, rétention d'urine, hernie étranglée, hydro- céphalie, etc. ... De l'Aspiration, Méthode de diagnostic et de traitement.

421 - L'inégalité pupillaire signe possible de l'abcès du foie. COUTEAUD .. 307 - Traitement de la dysenterie par la "méthode chinoise". MATIGNON (J.-J.).

1 mai 2017 . Les annales internat de la Conférence Hippocrate Cas clinique du mois. Concours médical. Annales internat. Annales internat. Concours.

Pneumonie adynamique, traitement par l'éther phosphoré, guérison par M. Vidal (de .. A quelque moment que l'on soit appelé pour une hernie étranglée, c'est un .. des collections liquides (empyème, abcès du foie, abcès par congestion, etc.) .. très développé basé entièrement sur cette donnée médico-chirurgicale.

Traité de l'aspiration des liquides morbides. Méthode médico-chirurgicale de diagnostic et de traitement. Kystes et abcès du foie - Hernie étranglée - Rétention d'urine - Péricardite - Pleurésie - Hydarthrose, etc . Paris, G. Masson, 1873, in-8,.

Le principal intérêt de celui-ci est un diagnostic et un traitement précoces de tous les patients, . isthmique ou une infection urinaire maternelle ; plus souvent, la prématurité .. du méconium dans le liquide amniotique, gasps et aspiration du liquide .. La hernie inguinale de l'enfant est congénitale : elle correspond à la.

diagnostique (par opposition à un test sous-maximal) lorsque l'effort fourni .. degré de sexe féminin), une hypertension artérielle traitée ou non, un diabète sucré .. semaines après l'évènement (le plus souvent sous traitement) et de réaliser un .. Les consultations de médecine générale dans le centre médico-chirurgical.

Délai entre le diagnostic du cancer primitif et le syndrome occlusif... .. La mise en place d'une sonde urinaire : . Hernie inguinoscrotale droite étranglée, l'exploration chirurgicale a décelé une .. Prélèvement de la coque de l'abcès +aspiration .. liquide, à la fois par diminution de l'absorption et par exagération de la.

Bulletin general de tlierapeutique medicale et chirurgicale. Publ. par .. 350 Autuiij P., Du traitement de la hernie etranglee par aspiration sous-cutanee. 4. .. 450 Barailhe, J., Contribution an traitement des kystes hydatiques du foie. 4. .. 3229 — Th., Traite des retention d'urine causees par le retrecissement de l'uretre.

Traité de l'aspiration des liquides morbides. Méthode médico-chirurgicale de diagnostic et de traitement. Kystes et abcès du foie - Hernie étranglée - Rétention d'urine - Péricardite - Pleurésie - Hydarthrose, etc . Paris, G. Masson, 1873, in-8,.

14 déc. 2015 . Chapitre 33 Complications de soins médicaux et chirurgicaux. 662 ... ICD-10 afin de permettre un codage plus précis des diagnostics .. et que le traitement n'a été dirigé que vers la rétention urinaire. .. Bilateral inguinal hernia (Hernie inguinale bilatérale) .. Référez-vous au sous-terme "aspiration" et.

Chez un malade traité pour épilepsie, l'arrêt du traitement doit être organisé . Une fois le diagnostic posé, l'abstention thérapeutique peut être préconisée du fait .. une pyélonéphrite aiguë avec rétention urinaire .. Abcès amygdalien : référer pour drainage chirurgical .. Les kystes ingérés libèrent habituellement dans.

progressivement leurs capacités de diagnostic biologique et de traitement, les . la prise en charge des infections urinaires ou des hépatites virales. .. L'utilisateur peut ainsi bénéficier à la fois de l'interactivité spécifique à ce .. L'aspiration des sécrétions par la sonde d'intubation est une méthode .. médico-chirurgicale.

gie, pôle médico-chirurgical de pédiatrie, hôpital des enfants, Toulouse. . rassemblant les données utiles au diagnostic et aux bonnes pratiques ... nés (NH2) qui sont intégrés dans le foie dans le cycle de ... bées plus facilement et éliminées dans les urines lorsque .. taires (gélules, sachets, poudres, liquides...).

Epidémiologie des affections médico-chirurgicales de l'enfant en réanimation au CHU de ...

Insuffisance hépatocellulaire : Diagnostic, pronostic et traitement.

Méthodes d'exploration. ... Leur diagnostic et leur traitement sont les mêmes que pour les autres .. 1 : Anatomie chirurgicale du canal inguinal : les trois types de hernies sont fléchés. . A droite, le lobe droit du foie protège le diaphragme. .. de l'obésité (reflux et obésité sont traités dans le chapitre de l'obésité morbide) ;

15 févr. 2017 . Intérêt du traitement local du cancer du sein métastatique associé au .. Chez l'ensemble des patients traités on a obtenu des résultats ... le traitement chirurgical des uropathies malformatives, et l'épuration extrarénale en stade d'IRCT. .. La hernie inguinale étranglée reste une affection relativement.

Traité de l'aspiration des liquides morbides, [méthode médico-chirurgicale de diagnostic et de traitement : kystes et abcès du foie, hernie étranglée, rétention.

une grenouillette ordinaire déjà traitée (Comp. de chirurgie), ce qui permet de la . Le traitement n'est possible que si le kyste ne communique plus avec .. épanchements purulents de la plèvre, des abcès du foie se frayant un ... voie du diagnostic. .. liquide, et en faciliter la sortie à l'aide de l'aspiration avec une se-.

. Traité de l'aspiration des liquides morbides, méthode médico-chirurgicale de . et de traitement : kystes et abcès du foie, hernie étranglée, rétention d'urine.,.

Abcès et empyèmes intracrâniens. 166 ... Réanimation et USC médico-chirurgicale .. Défaut de concentration des urines, tendance à la rétention hydrique. 3. .. Chirurgie mineure : 2 à 4 ml/kg/h (hernie inguinale) .. Kyste dermoïde intra-cranien ... Il faut que le syndrome de sevrage soit prévenu, diagnostiqué et traité.

Le traitement chirurgical des grandes cyphoses par ostéotomie rachidienne a longtemps . Si le diagnostic, en cas de genou encore luxé lors du premier examen, ... Tous les patients ont bénéficié d'une réinsertion du labrum et d'une rétention .. Une fois l'infection suspectée, une mauvaise gestion du liquide de ponction.

Traité de l'aspiration des liquides morbides. Méthode médico-chirurgicale de diagnostic et de traitement. Kystes et abcès du foie - Hernie étranglée - Rétention d'urine - Péricardite - Pleurésie - Hydarthrose, etc · [nach diesem Titel suchen].

29 août 2003 . La difficulté diagnostique persistante, malgré les progrès de . infectieux que des modalités du traitement chirurgical ... présence d'un abcès périvalvulaire au cours de l'endocardite .. valve native et prothétique, sans complication intracardiaque, traités ... portant sur la prostate et les voies urinaires.

Dissertazioni medico-chirurgico-pratiche, estratte dagli Atti della r. i. Accademia ... Sketch of the Proceedings of the Medical and Surgical Faculty of Maryland at .. Essai clinique sur les abcès du foie. .. Bon- net, Nouvelles méthodes de traitement des maladies articu- laires. .. 'Du diagnostic de la rétention d'urine.

Address of Earl Stanhope, president of the Medico-Botanical Society, at the . Medical and Surgical Society of London, at the annual meeting, March 2nd, 1885. .. with its use and action, also, the urine, of what composed, its properties and .. Contribution à l'étude des kystes hydatiques du foie : diagnostic et traitement.

L'aspirateur à encoche auquel Dieulafoy a donné son nom, est représenté en fin de volume.

Figures dans . Méthode médico-chirurgicale de diagnostic et de traitement. Kystes et abcès du foie. Hernie étranglée. Rétention d'urine. Péricardite.

Pneumothorax spontané : diagnostic et prise en charge. 1 .. Dans un 2^{me} temps on peut relier l'aiguille à un système d'aspiration .. Dg dif : se méfier des urgences médico-chirurgicales avec CPA facilement .. rétention d'urine fréquente ; ... Le traitement antibiotique est institué d'urgence, une fois les prélèvements.

31 déc. 2010 . Cirodde Audrey, médecin principal, Centre de traitement des brûlés, HIA ... 3.2 Méthodes d'hémostase externe .. hypothermes à l'arrivée à l'hôpital médico-chirurgical [37]. .. de l'échancrure par résection de kyste spino-glénoïdien. .. très vaste allant de la césarienne à la cure de hernie inguinale, en.

13 avr. 2017 . La multiplicité des techniques chirurgicales dans le traitement de l'hypospadias de ... Patientes et méthodes : Il s'agissait d'une étude rétrospective, ... natales, des hernies étranglées, des malformations congénitales de la paroi ... plaie urétérale et une rétention aiguë d'urines en période post-opératoire.

7 mai 2014 . chirurgie générale et digestive du CHU Yalgado . pour le traitement de l'Ulcère de Buruli .. CO56 : Rétention aiguë d'urines chez l'homme . surveillance des patients traités d'un .. CO87 : Diagnostic tardif du cancer du sein au CHU .. Méthode. L'étude est menée auprès d'un panel d'enfants de 0-10.

1 juin 2015 . Diagnostic de la broncho-pneumopathie chronique obstructive asymptomatique par . Kyste hydatique du psoas: à propos d'un cas.

27 déc. 2016 . Une fois l'équipe du SMUR en préhospitalier ou de réanimation à l'hôpital .. abcès intra-abdominaux, chirurgie abdominale Traitement Ponction pleurale .. 98 Réanimation et urgences Orifice relié à la source d'aspiration Orifice .. et la gestion des sondes ; les troubles liés à la rétention urinaire et à la.

N aspirations vers la restauration du concours, elle aurait lié le moment de cette .. graves, telles que l'ovario- tomie, l'opération césarienne, la hernie étranglée. ... qui leur ont donné naissance, et que l'on constate dans le liquide urinaire. .. Traité du diagnostic des maladies chirurgicales, par Em. Toucher, professeur.

diagnostic et du traitement de cette petite, mais terrible lésion stomacale, l' .. pitre nouveau a ajouter a l' histoire médico-chirurgicale de s ulcérations de l'.

Item n° 202 : Exposition accidentelle aux liquides biologiques . Item n° 207 : Infections aiguës des parties molles (abcès, panaris . En cas de primo-infection confirmée, traitement par spiramycine en attendant les .. ou de localisations secondaires (arthrite septique, urine) chaque fois .. Il sera médico-chirurgical.

Compte tenu de la quantité de liquide à absorber la préparation fractionnée a .. Quintero E, Jimenez A. Good colon preparation guarants a higher diagnostic yield of .. Sinon le traitement est le drainage chirurgical en urgence, associé le plus .. euphorie, dysphorie, hypotension orthostatique, dysurie et rétention urinaire,.

17 août 2009 . Traité de l'aspiration des liquides morbides, méthode médico-chirurgicale de diagnostic et de traitement : kystes et abcès du foie, hernie étranglée, rétention d'urine, péricardite, pleurésie, hydarthrose, etc., par le Dr Georges Dieulafoy,. -- 1873 -- livre.

À dessein il se limite au traitement des situations les plus fréquentes et n'est pas conçu .. Il traite d'abord de l'installation de base du service chirurgical et des priorités .. Si vous suspectez une rétention urinaire, posez une sonde de Foley. ... Le signe clinique d'une hernie inguinale est une tuméfaction de l'aîne.

De la nature du bégaiement et de son traitement, par la méthode Chervin. — Rapport . comme positives, sur les maladies des voies urinaires, et peut-être . médico-chirurgicale, sait appliquer lui-même et avec .. kystes de même nature rencontrés dans le foie. .. traité Des Hernies, publié en 1561, Franco décrit un très-.

. abbasside abbatiale abbatiale abbatiat abbaye abbess abbeyillienne abbé abc abcès ... aspic aspidistra aspirante aspirateur aspiration aspiratoire aspiratrice aspirer .. diadème diadémée diagnose diagnostic diagnosticienne diagnostiquer .. médecinier médico-chirurgicale médico-légale médico-professionnelle.

Le progrès médical : journal de médecine, de chirurgie et de pharmacie 1873, série .. Séance

du 9 mai / Maladies des voies urinaires. Mémoire ... 2° Traité de l'aspiration des liquides morbides. (Méthode médico-chirurgicale de diagnostic et de traitement. - Kystes et abcès du foie. - Hernie étranglée. - Rétention d'urine.

Résumés des e-posters du congrès SFO 2017 Cataracte 385 Chirurgie de cataracte sur ..

Matériels et Méthodes : Nous avons consulté les dossiers des patients opérés de .. Discussion : Le pronostic dépend de la précocité du traitement. .. La cataracte était bilatérale au moment du diagnostic dans tous les cas avec une.

post-entéritique (persistance de selles liquides lors d'une réalimentation .. En cas d'échec d'un traitement, il faut mettre en doute le diagnostic d'asthme, . des signes par les bêta 2 adrénergiques de courte durée d'action (QS traite- .. urgence médico-chirurgicale ; .. d) La constipation, le prurit, la rétention urinaire.

comparaison des méthodes et des procédés au point .. chacun de nous traite dans cet ouvrage la partie .. traitement de l'in- . foie, résection du foie, kyslo-hépatostomie, hépatotomie pour abcès, .. glées, cure radicale de la hernie inguinale et .. rétention, l'obstacle au drainage du rein par l'uretère. Cet obstacle est le.

5 mai 2015 . fois partie puis j français donc également moins première trois point vie années .. traité bientôt forte moyenne véritable moitié matière composé . méthode utilisée rapide belge actions simplement longueur goût ... liquide proie impôt fussent excellent transfert résulte initialement .. médico-chirurgicale

Les scénarios concernaient des détresses médicales ou chirurgicales (traumatisés) .

complémentaire de l'apprentissage théorique et il prolonge la rétention de ce dernier ..

l'évolution des patients traités par EP ou traitement symptomatique n'a pas .. Les patients présentant au diagnostic une ostéomyélite ou un abcès.

Chapitre 4 : Orientation diagnostique et conduite à tenir devant un .. Une fois transféré dans un service de réanimation ou de soins intensifs, .. Les dysfonctions valvulaires : le traitement sera le plus souvent chirurgical. .. du contenu orbitaire peut être incarcérée (équivalent d'une hernie étranglée). ... obésité morbide.

26 oct. 2001 . lithiase biliaire dans 92% des cas, un kyste ovarien dans . et d'hypertension artérielle, réversibles sous traitement .. 1 . Andem .-Evaluation des méthodes coelioscopiques en chirurgie . coelioscopie pour le diagnostic des plaies abdominales. ... tion (hernie hiatale, colectomie, cure de hernie inguinale).

TH/TU27, Cotnribution à l'étude du traitement chirurgical des cancers des voies biliaires et du .. TH/TU92, De La Définition medico-légale de la maladie professionnelle en Tunisie. .

TH/TU110, A propos de 37 faux diagnostics de kyste hydatique du foie. ... A propos de 237 cas traités à l'hôpital militaire de Tunis.

28 avr. 2017 . La TDM abdominale a montré une volumineuse masse kystique de .. Matériel et méthodes : . L'abcès du psoas : Etiologie, diagnostic et traitement ... à une hernie de SPIGEL à contenu digestif et épiploïque étranglée, .. L'angiocholite aiguë lithiasique est une urgence médico-chirurgicale fréquente.

Le traitement chirurgical est l'option de choix souvent associée à un curage ... Méthodes Patients et méthodes: étude ouverte transversale, réalisée de 2007 .. le traitement des calculs du haut appareil urinaire: résultats a propos de 166 .. de plus de 50 ans qui présentent une hernie inguinale associée à des TUBA.

Recommandations pratiques pour le diagnostic et la prise en charge de la fibrose pulmonaire idiopathique – Actualisation 2017. Version longue; V. Cottin,.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----