


Retraits psychiques : Organisations pathologiques chez les patients psychotiques, névrosés et borderline PDF - Télécharger, Lire



TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description

pathologies psychiques souvent importantes, répertoriées comme telles . une modification pathologique de l'organisme ou du comportement .. névroses et psychoses ». . à une organisation psychopathologique précise, il sera classé ici en catégorie . trouble de l'identité

sexuelle chez l'adolescent, type non transsexuel.

18 août 2011 . Chez moi, je me détourne un peu plus souvent à ma librairie, d'où tout . de signes et de symptômes répondant à un état pathologique donné. .. Les névroses sont repérées en psychiatrie parmi les quatre cadres ... psychique des patients psychotiques que les cliniciens chevronnés de Maison Blanche!

Article: texte imprimé Analyse de : STEINER J. - Retraits psychiques. organisations pathologiques chez les patients psychotiques, névrosés et borderline. Paris.

2 nov. 2013 . L'ordre psychique», explique Marie-José Lacroix, psychosociologue et . névrose ou leur psychose Mais au moins, un premier pas est.

modifier - modifier le code - voir wikidata · Consultez la documentation du modèle. John Steiner . À toutes ces sous-positions, il convient d'ajouter le retrait psychique qui vise à échapper provisoirement - mais au prix . Organisation pathologiques chez les patients psychotiques, névrosés et borderline, 1996 PUF, coll.

PRÉFACE. LES PATIENTS qui présentent des troubles limites de la personnalité sont fascinants. ... Psychoses et névroses sont les variantes structurelles du « cristal de .. pathologiques, mais plongés en position d'intense souffrance psychique . que chez des malades avérés, soignés en psychiatrie, ou chez des grands.

Une première définition des patients Borderline, pourrait être celle, purement descriptive du DSM-IV. . plus « par défaut » que par la reconnaissance de critères précis quant à leur organisation intra-psychique. .. J.- Retraits Psychiques. Organisations pathologiques chez les patients psychotiques, névrosés et borderline.

Les unes, comme la schizophrénie ou les psychoses délirantes aiguës, ne sont pas .. les psychoses infantiles mais aussi les diverses organisations pathologiques . La présence de tels troubles dans l'enfance de l'adolescent chez qui on ... avait fait de ce retrait de la libido sur le Moi la caractéristique des « névroses.

Les enjeux contre-transférentiels puissants suscités par ces patients seront approfondis, en particulier .. Steiner, J., 1993, Retraits psychiques : organisations pathologiques chez les patients psychotiques, névrosés et borderline, PUF, Paris.

Retraits psychiques : organisations pathologiques chez les patients psychotiques, névrosés et borderline. Auteurs : Steiner, John ; Préf. Schafer, Roy ; Trad.

15 déc. 2005 . L'organisation de l'audition publique a été assurée par Mmes ... séparer la psychopathie des psychoses schizophréniques, en .. Chez le psychopathe, la longue évocation des traumatismes précoces est .. En termes d'association à des personnalités pathologiques, la personnalité borderline et plus.

Découvrez Retraits psychiques - Organisations pathologiques chez les patients psychotiques, névrosés et borderline le livre de John Steiner sur decitre.fr.

Personnalité borderline Le terme de. . John Steiner, Retraits psychiques. Organisations pathologiques chez les patients psychotiques, névrosés et borderline,.

LES TROUBLES DE PERSONNALITE LIMITE (BORDERLINE) . . LES NEVROSES . . troubles psychotiques, des troubles de l'humeur, des troubles majeurs de la .. l'intégrité physique, psychique et sociale de l'individu en fonction de ses ... et du tonus musculaire (attention chez les patients qui ont des troubles.

physiques et psychiques, à produire des preuves d'une inaptitude à . névroses dites d'appétence (déclenchées par un accident et de ce fait .. des symptômes et ce qui relève d'un état pathologique au . portement de l'Organisation Mond- . déficits que l'on retrouve en particulier chez des patients . Vivant le retrait.

8 mars 2017 . J. Steiner (1993), Les retraits psychiques, organisations pathologiques chez les patients psychotiques névrosés et borderline, Paris, puf, 1996,.

Définitions de Personnalité borderline, synonymes, antonymes, dérivés de Personnalité . Cette organisation psychique à la frontière, « entre deux eaux », suggère en fait que les théories ...

John Steiner, Retraits psychiques. Organisations pathologiques chez les patients psychotiques, névrosés et borderline, PUF, 1996.

Sous-tendues par la notion de structure. Névrose. Psychose. Retentissement fonctionnel .

Défini comme mode d'organisation de la personnalité . Entre 15 et 50% des patients hospitalisés en psychiatrie. . trouble « borderline » défini comme une psychose .. Magnan : « La dégénérescence est l'état pathologique de.

Botella C. & s., La figurabilité psychique, paris-lausanne, delachaux et niestlé, 2001. . Ogden t.h., « travailler à la frontière du rêve », Revue française de psychanalyse, hors- série, 2001.

steiner J., Retraits psychiques. Organisations pathologiques chez les patients psychotiques, névrosés et borderline, paris, presses.

Retraits psychiques : Organisations pathologiques chez les patients psychotiques, névrosés et borderline. John Steiner (Auteur). Prix : Cet article n'a pas encore.

Télécharger Retraits psychiques : Organisations pathologiques chez les patients psychotiques, névrosés et borderline livre en format de fichier epub.

ou 8€³⁶ -5% avec le retrait en magasin .. il est souvent bien difficile chez les 15-30 ans de faire la part des choses entre. . La problématique du soin des patients traumatisés psychiques fait l'objet de .. de façon claire l'organisation des personnalités pathologiques et d'élaborer ... Les psychoses de l'adulte 2nde édition.

Titre : Retraits psychiques : organisations pathologiques chez les patients psychotiques, névrosés et borderline. Auteurs : John STEINER ; Roy SHAFER, Préf.

29 sept. 2015 . Retraits psychiques / John Steiner ; trad. de l'anglais par Jacqueline Adamov, 1996 .. psychiques [Texte imprimé] : organisations pathologiques chez les patients psychotiques, névrosés et borderline / John Steiner ; préf. de.

collective, génèrent chez les jeunes accueillis en structure collective, des . La littérature sur le sujet des troubles psychiques des adolescents, .. borderline », désigne des organisations pathologiques ressortissant de .. que celles qui ressortent des états névrosés ou psychotiques. .. L'observateur patient, attentif et.

Le terme d'« organisations pathologiques de la personnalité » fait référence à . Les organisations pathologiques fournissent aux patients un équilibre psychique . peut conceptualiser comme étant un retrait des activités normales ainsi que .. pathologiques chez les patients psychotiques, névrosés et borderline, Paris,.

Retraits psychiques : organisations pathologiques chez les patients psychotiques, névrosés et borderline · John Steiner, Auteur | Paris : PUF | Le fil rouge | 1996.

Finden Sie alle Bücher von John Steiner - Retraits psychiques : Organisations pathologiques chez les patients psychotiques, névrosés et borderline. Bei der.

Psychopathie (et organisations psychopathiques) . Névrose obsessionnelle .. Chez les patients psychotiques, la maladie survient sans cause connue. .. des voyages pathologiques, des agressions, des comportements clastiques. ... L'aménagement état limite est un effort que le psychisme fait en permanence pour se.

Découvrez et achetez TROUBLES GRAVES DE LA PERSONNALITE, stratégies . - Otto F. Kernberg - Presses universitaires de France sur www.armitiere.com.

"Organisation dynamique des aspects cognitifs, affectifs, conatifs, . qui peuvent annoncer l'organisation d'un trouble psychique évolutif, varient donc . Personnalité pathologique qui réalise une normalité de façade, voire une . névrose d'échec . Des associations sont fréquentes chez un même patient (2,8 à 4,6 p.100 en.

4 mai 2011 . Quand les patients surdoués mal identifiés se voient prescrire des médicaments

pour supprimer les "symptômes du surdon", il y a un vrai.

que Kraepelin [49] en dépit de la dichotomie psychose/névrose décrivait déjà . d'objet chez les patients borderline afin de mieux comprendre et gérer leur grande .. souvent pathologique de la personnalité considérée dans des aspects . Little [56] et nous soutiendrons l'hypothèse d'une organisation psychique comparti-.

12 févr. 2004 . Découvrez et achetez Psychanalyse clinique - Hanna Segal - Presses universitaires de France sur www.librairiecharlemagne.com.

Retraits psychiques, organisations pathologiques chez les patients psychotiques, névrosés et borderline. John Steiner. Presses universitaires de France.

18 mai 1999 . Retraits psychiques. organisations pathologiques chez les patients psychotiques, névrosés et borderline. De John Steiner. Traduit par.

Approche ergothérapique de la relation à l'objet de malades psychotiques en post-cure / Françoise PAGE .. Retraits psychiques. Organisations pathologiques chez les patients psychotiques, névrosés et borderline / John STEINER ... Universaux de psychanalyse dans le traitement des états psychotiques et borderline.

Cette approche postule que le sujet et ses fonctions psychiques, soumis à des . produire de véritables organisations pathologiques, elles-mêmes sources de vulnérabilités . troubles du développement, narcissiques et borderline, psychoses, affections ... toire ». Elle fait intervenir l'expression chez le patient et différentes.

[[Harold Searles]] considère que, chez les patients borderline, le moi fonctionne sur un .. | [[Ça]] / Réalité [[idéal du Moi]] / Réalité } Cette organisation psychique à la frontière, « entre .. [[John Steiner]], "Retraits psychiques. Organisations pathologiques chez les patients psychotiques, névrosés et borderline", PUF, 1996.

acute s et borderline Par John Steiner. Free Download : Retraits psychiques : Organisations pathologiques chez les patients. psychotiques, névrosés et.

5 sept. 2016 . noyau de l'angoisse et ainsi le pathologique comme le non pathologique . névrose - psychose - perversion. Personnalité . psychique, n'ayant pas de cause organique lésionnelle, étant ... Personnalité borderline ou état limite . La dépression anaclitique est une détresse chez l'enfant qui a déjà connu.

28 oct. 2013 . 2)le groupe des névroses . c) les états psychotiques aigus : sémiologie et forme . La psychopathologie est la science de la souffrance psychique. .. Les états limites appelés aussi borderline ou pathologie narcissique. .. n'est ni normale ni pathologique : le sujet qui fonctionne selon cette organisation.

A. Par la conscience du caractère pathologique du symptôme . D. Ce qu'on appelait jadis folie du doute puis névrose obsessionnelle. 5. Chez les patients ayant un diagnostic de schizophrénie, le TOC est : ... en retrouve dans le trouble de la personnalité borderline, antisocial, dans ... d'anéantissement psychique.

Retraits psychiques - Organisations pathologiques chez les patients psychotiques, névrosés et borderline, John Steiner, Presses Universitaires de France - PUF.

STEINER, J., (1996), Retraits psychiques. Organisations pathologiques chez les patients psychotiques, névrosés et borderline. Paris, PUF, coll. Le fil rouge.

du psychisme qui s'intéresse d'abord à la liberté du sujet, plutôt qu'à .. scholia et éventuels lecteurs, que chez le loup boréal - ou nordique-, il n'y a .. des personnalités schizoïde, borderline, dépendante et évitante ... On peut être névrosé et présenter des symptômes d'ordre psychotique, et inversement.

Let's make our minds fresh by reading Retraits psychiques : Organisations pathologiques chez les patients psychotiques, névrosés et borderline PDF Online,.

Le retrait immédiat par les forces ... d'une phase dépressive (dépression post-psychotique). .

névrose hystérique est la névrose entraînant le risque . sonnalités pathologiques sont particulièrement impliqués, . Le niveau de souffrance psychique, avec en parti- . souvent retrouvées chez des patients dépressifs [2].

Contrairement aux névroses et aux psychoses, il s'agit d'un trouble, plutôt que d'une . Ce trouble est fréquent : on parle de plus en plus de patients « états-limites ». . -1975 Bergeret : il parle d'une organisation autonome distincte, ni psychose ni . L'humeur est labile, l'intensité est plus grande que chez l'hystérique.

Le caractère névrosé est la somme de toutes les défenses mises en place par le sujet . Son regard dynamique va se porter sur les organisations pulsionnelles, les .. l'élimination de la cuirasse psychique par l'analyse caractérielle est capable de .. comme pour le trouble de la personnalité borderline qui peut coexister.

29 nov. 2010 . 1La clinique concerne le rapport direct aux patients. . 6Chez certains collègues qui se rattachent à d'autres écoles, .. économie psychique » concerne non seulement la névrose, mais aussi ... que certains rapprochent de la psychose et appellent borderline34. . 90 - le « I would prefer not to36 » (retrait).

Retraits psychiques : Organisations pathologiques chez les patients psychotiques, névrosés et borderline PDF, EPUB, EBOOK, MOBI lire ou télécharger.

11 mars 2016 . Amis, proches, collègues, patients... . Résumé : Si la négativité psychique est commune à chacun, elle ... L'hypothèse générale est la suivante : chez ces sujets le travail de la ... l'attaque des liens dans les cas de « psychose borderline » . conception, le négatif pathologique pourrait résider dans les.

Semrad E., « The organization of ego defenses and object loss », in D. M. Moriarty (éd.), *The Loss of Loved Ones*, Springfield, Charles C. . Steiner J., *Retraits psychiques. Organisations pathologiques chez les patients psychotiques, névrosés et borderline*, Paris, PUF, 1993/1996. Stolorow R. D., Lachmann F. M., « The.

3"" sous-section: (Anatomie et cytologie pathologiques) ... la perte d'un objet chez le sujet état limite. . dépressive dans l'organisation limite de la personnalité. . De l'autre côté le patient névrotique était un malade psychique qui ne .. formes majeures de névroses, d'une forme de passage entre névrose et psychose.

Les états cliniques, à la frontière entre névrose et psychose, sont qualifiés par . borderline est utilisé aux Etats-Unis en 1935-1936, pour décrire des patients . Kohut qui considère l'état-limite comme une organisation et non pas comme une structure. .. organiques qui témoignent de défaut d'intégration somato-psychique.

Avec une attention particulière à l'état psychotique », *Revue française de . tion dans les pathologies névrotiques et borderline*, et pour finir je formulerai ... dans un retrait psychique, dans une réalité fantasmatique dissociée (Klein, ... organisations pathologiques chez les patients psychotiques, névrosés et borderline,.

Retraits psychiques : Organisations pathologiques chez les patients psychotiques, névrosés et borderline de Steiner Jorg sur AbeBooks.fr - ISBN 10.

Retraits psychiques : organisations pathologiques chez les patients psychotiques, névrosés et borderline / John Steiner ; préf. de Roy Schafer ; trad. de l'anglais.

Cette approche postule que le sujet et ses fonctions psychiques, soumis à des . produire de véritables organisations pathologiques, elles-mêmes sources de vulnérabilités . troubles du développement, narcissiques et borderline, psychoses, affections ... toire ». Elle fait intervenir l'expression chez le patient et différentes.

Trouble de la personnalité borderline Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. . Cette organisation psychique à la frontière, entre deux eaux, suggère en fait que .. John Steiner : *Retraits psychiques. Organisations pathologiques chez les patients psychotiques, névrosés et*

borderline, PUF, 1996, ISBN 2130477585

L'adolescence est une période de remaniement psychique et physique. La question du . Retrait social et repli à domicile chez l'adulte : Retraits pathologiques ? [Editorial] · Retrait social et repli à .. Ajouter au panier. Retraits psychiques : organisations pathologiques chez les patients psychotiques, névrosés et borderline.

Noté 5.0/5 Retraits psychiques : Organisations pathologiques chez les patients psychotiques, névrosés et borderline, Presses Universitaires de France - PUF,.

Voilà le beau défi de la borderline !!! » Benoît . 2-1-3) La relation anaclitique chez l'état limite.....p.8 .. pour les structures psychotique et névrotique et l'organisation Limite. .. 4 Jean Bergeret, La personnalité normale et pathologique, p141 ... due à une défaillance de son organisation psychique.

Les critères de déficience psychique sont énumérés dans le. « Guide-Barème pour .. terminologie psychiatrique : névrose, psychose... ce sont des termes que.

PDF Retraits psychiques : Organisations pathologiques chez les patients psychotiques, névrosés et borderline Téléc. PDF Retraits psychiques : Organisations.

Retraits psychiques [Texte imprimé] : organisations pathologiques chez les patients psychotiques, névrosés et borderline / John Steiner ; préf. de Roy Schafer.

Retraits psychiques. organisations pathologiques chez les patients psychotiques, névrosés et borderline. Description matérielle : 230 p. Description : Note.

psychopathologiques spécifiques (névrose, psychose, état-limite) d'autre part. Les auteurs se . sont expliquées en fonction de la dynamique intra-psychique du sujet ; 2) celle pour . spécifie psychopathological organization : borderline. . traits de la personnalité et/ou symptômes retrouvés chez de nombreux addicts.

Retraits psychiques : organisations pathologiques chez les patients psychotiques, névrosés et borderline, PUF, 1996. Sunderland M & Armstrong N, 2003,.

Organisations pathologiques chez les patients psychotiques, névrosés et borderline. John Steiner. Editeur: Presses Universitaires de France - PUF. Collection:.

En ce qui concerne les « cas limites » (borderline cases), selon l'auteur, « on trouve des . Ensuite, la période prépsychotique – chez Schreber – met en relief la . Ey indique que la schizophrénie « peut prendre l'allure d'une névrose plus ou ... qui est utilisé tantôt pour évoquer une organisation qui précède la psychose,.

Le taux de suicide chez les patients souffrant de TPB atteint 8 à 10 pour cent '. ... Cette organisation psychique à la frontière, « entre deux eaux », suggère en fait que ... (ISBN 2912186129); John Steiner, Retraits psychiques. Organisations pathologiques chez les patients psychotiques, névrosés et borderline, PUF, 1996.

Mots clés : Image, violence, jeu vidéo, adolescence, retrait, rêverie. ... les problématiques borderline ou psychotiques, le retrait est aussi propre à la . un repli dont souffre le patient, mais il peut être l'objet d'une idéalisation dans .. STEINER, J. (1996) Retraits psychiques : organisations pathologiques chez les sujets.

17 mai 2016 . Ces individuEs et organisations variéEs conviennent généralement que le savoir . qui sont le plus exclusivement diagnostiqués chez les femmes (AAP 1994): le . dépendante (TPD), et le trouble de la personnalité borderline (TPB). ... des « névroséEs », mais pas aussi malades que des « psychotiques.

. deux grands cadres structurels de personnalité, soit la psychose et la névrose, ne peuvent convenir . contiennent des groupes hétérogènes de patients limites. . métapsychologique, Bergeret (1992) fait l'analyse de la vie psychique de l'état limite selon .. psychopathologiques rencontrés chez l'organisation borderline.

Très dynamique durant l'enfance, l'organisation psychique prend des formes fixes à .

psychique archaïque et déréalisant et un pôle intermédiaire (dit borderline ou . la névrose était une affection nerveuse et la psychose une maladie mentale. . L'aspect pathologique vient de la perte ou à l'absence de repères culturels,.

Les structures sexuelles de la vie psychique. Paris : Payot, 1977. MELTZER, D. et al. . Retraits psychiques. Organisations pathologiques chez les patients psychotiques, névrosés et borderline. Paris : PUF, 1996. La Tavistock.

Item 67 æ Troubles psychiques de la grossesse et du post partum. ... La distinction entre névrose et psychose n'est plus à utiliser. . Les patients suivis dans les services sectorisés de psychiatrie souffrent principa .. Les troubles psychiatriques chez les parents avec le risque d'une grossesse mal ... trouble borderline.

Le taux de suicide chez les patients souffrant de TPB atteint 8 à 10 pour cent '. ... Cette organisation psychique à la frontière, « entre deux eaux », suggère en fait que ... (ISBN 2912186129); John Steiner, Retraits psychiques. Organisations pathologiques chez les patients psychotiques, névrosés et borderline, PUF, 1996.

Personnalité borderline : confrontation entre diagnostic clinique et diagnostic standardisé . personnalité antérieure les prémices de l'organisation pathologique actuelle. . Dans cette même période, Deutsch décrit chez ces patients des distorsions .. chez le sujet névrosé, et de l'angoisse de morcellement du psychotique.

Différence entre névrose et psychose. 19 . Organisations. 36 . La névrose d'angoisse. 56 .. semaines, le patient est considéré comme déprimé ou comme maniaque. . Par exemple, lorsqu'il y a retrait social, plusieurs diagnostics sont ... acquis socioprofessionnels : bipolarité de la vie psychique ; schizophrénie simple :.

18 avr. 2007 . adulte chez un sujet présentant des symptômes borderline à l'adolescence, voire . important, in particular with adolescent patients: frequency . CIM 10) ou psychanalytique (psychose, névrose, perversion), et ... La fixation pathologique . l'organisation psychique du fait de la compulsion de répétition.

Retraits Psychiques - Organisations Pathologiques Chez Les Patients Psychotiques, Nevroses Et Borderline Occasion ou Neuf par John Steiner (PUF). Profitez.

Make it easy to read Retraits psychiques : Organisations pathologiques chez les patients psychotiques, névrosés et borderline PDF Online book, without need to.

Retraits psychiques organisations pathologiques chez les patients psychotiques, névrosés et borderline. Livre. En rayon. Ajouter au panier Ajouter aux favoris.

du cortex préfrontal chez les états--limites . Conséquences du stress pathologique .. Les troubles anxieux (manifestadons psychiques et/ou .. Organisation névrotique de la .

NEVROSE HYSTERIQUE Conversion hystérique .. Personnalité borderline .. AMELIORER LE PRONOSTIC DU PATIENT DEPRESSIF.

2 juil. 2016 . Retraits Psychiques : Organisations Pathologiques Chez Les Patients Psychotiques, Nevroses Et Borderline PDF Online, Believe or not, this is.

AbeBooks.com: Retraits psychiques : Organisations pathologiques chez les patients psychotiques, névrosés et borderline (9782130477587) by Steiner Jorg.

John Steiner, Retraits psychiques. Organisations pathologiques chez les patients psychotiques, névrosés et borderline, PUF, 1996. (ISBN 2130477585).

Comme on sait, il est bien des façons psychiques de circonscrire un tel péril .. divers, depuis la névrose hystérique jusqu'aux formes psychotiques les plus graves. On meurt . violeur, les registres se confondent, comme si, chez l'anorexique, la féminité était . Qu'elle s'y trouve confrontée, quand le patient est borderline, et.

Document: texte imprimé Retraits psychiques : organisations pathologiques chez les patients psychotiques, névrosés et borderline (1996) / John STEINER.

ger))) daneuabookaec Retraits psychiques Organisations pathologiques chez les patients psychotiques n vros s et borderline by John Steiner Gratuit PDF.

26 oct. 2016 . Le paraître hystérique qui paralyse sa présence, le retrait de l'obsessionnel . Les psychoses sont une défaillance ontologique à être son temps dans le . de la temporalité dans les névroses et les psychoses . sa continuité psychique dans la discontinuité de son surgissement, ... Personnalité Borderline.

Troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte . psychose paranoïaque (F22.0): schizophrénie paranoïde (F20.0) . Trouble de la personnalité caractérisé par un retrait des contacts (sociaux, affectifs . agressive; borderline; explosive ... physique, mais amplifiés ou entretenus par l'état psychique du patient.

4 sept. 2013 . Spécialité "Psychopathologie : processus psychiques, ... d'organisation psychique (névroses, psychoses, perversions, .. -L'adaptation et ses troubles chez les patients atteints de pathologies somatiques chroniques et . Retrait relationnel chez le jeune enfant : Echelle ADBBI, liens avec la dépression.

22 juin 2014 . La « limite » est donc du côté de la dépression psychotique telle qu'on la .. Les symptômes hystériques: à la différence de la névrose hystérique . Les conduites sexuelles déviantes sont fréquentes chez les patients limites. ... Elle considère la réalité d'une organisation psychique spécifique construite sur.

Découvrez et achetez Freud pour débutants - Richard Appignanesi - F. Maspero sur lespetitspapiers.org.

22 avr. 2003 . Ces patients réussissent souvent à faire en sorte que l'analyste se sente . Ainsi, l'état narcissique se caractérise par un retrait de l'investissement des . Klein a observé comme une constante psychique dans l'attitude des . La première analyse du narcissisme pathologique chez Rosenfeld date de 1963.

Trouble de la personnalité, les personnalités pathologiques . avec passage à l'acte suicidaire ne doivent pas être sous-estimés chez ce type de patients. . Les personnalité borderline, de par leur impulsivité et agressivité peuvent devenir . et ils n'ont pas régressé vers ces fixations, ils ne sont ni névrosés ni psychotiques.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----